

Памятка о проведении вакцинации против COVID-19

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 ВАКЦИНОЙ «ГАМ-КОВИД-ВАК»

Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье – наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:

1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов класса G и M к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.
2. Противопоказаниями к вакцинации являются:
 - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
 - тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
 - острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
 - обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
 - беременность и период грудного вскармливания;
 - возраст до 18 лет.
3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.
4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.
5. В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.
6. После проведения вакцинации (и после введения I компонента, и после введения II компонента) в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артритом, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19»?

Электронная запись

Осуществляется через единый портал «ГосУслуги»

госуслуги

Информационный портал

Чтобы записаться на едином портале государственных услуг нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу» во вкладке «Вакцинация от COVID-19»

Запись по телефону

Пошаговая инструкция

Запись в поликлинике по месту жительства

Если ваш вопрос не решен



Муниципальный штаб по борьбе с COVID-19

Если ваш вопрос не решен



Горячая линия министерства здравоохранения Ростовской области по вопросам вакцинации от COVID-19

8(928)120-39-49

Если ваш вопрос не решен

Региональный штаб Ростовской области по борьбе с COVID-19

**8(800)200-46-53
8(863)28-505-43**

Если ваш вопрос не решен

Горячая линия министерства здравоохранения России по борьбе с COVID-19

8(800)200-0-200

Если ваш вопрос не решен



Федеральная горячая линия
8(800)20-00-112

*следуя выше указанной схеме вы сокращаете время записи на вакцинацию от COVID-19

